

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<b>HOJA INFORMATIVA</b>  <b>TEST DE GRAHAM</b>	Rev.0	Pag. 1 de 1
		ASSTNM-FI-453	

## **BÚSQUEDA DE HUEVOS DE ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIUIROS) - TEST DE GRAHAM**

**Examen/Análisis:** OXIURIOS (*Enterobius vermicularis*) - búsqueda microscópica (test de GRAHAM)

**Abreviatura y sinónimos:** prueba del celo

### **Significado diagnóstico**

*Enterobius vermicularis* es un parásito intestinal cosmopolita, frecuente sobre todo en las comunidades infantiles. Después de la transmisión (ingestión de huevos), el gusano madura y se localiza en el ciego.

En la etapa madura, el gusano hembra abandona el ciego por la noche y migra hacia la abertura anal, donde deposita los huevos. El síntoma predominante es el prurito en la región anal causado por la migración del gusano hembra. En los niños, la transmisión es común al transportar los huevos desde el ano a la boca a causa del prurito.

### **INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TEST DE GRAHAM**

Por la mañana, sin lavarse en la región anal:

- cortar un trozo de cinta adhesiva (debe ser transparente) de unos 5-6 cm
- separar las nalgas y aplicar la cinta adhesiva en el orificio anal
- inmediatamente después, pegar la cinta adhesiva en el portaobjetos, evitando la formación de pliegues o burbujas.
- Conservar el portaobjetos a temperatura ambiente en el estuche de portaobjetos.

**La muestra debe ser entregada DENTRO DE 2 HORAS de la recogida.**